

# Glukagoninjektion – Hur den används

Så här ser en glukagonspruta ut. Observera att det finns detaljerade steg längre ned.




Om Charlie är **medvetslös p.g.a. lågt blodsocker**, följ dessa steg för att snabbt ge **glukagon**.

Tänk på att *aldrig* ge något i munnen till Charlie om han svimmat!

## 1. Förbered sprutan


- Ta ut flaskan (med pulver) och sprutan (med vätska) ur förpackningen.
- Ta bort plasthättan från flaskan.

- Spruta in vätskan från sprutan in i flaskan med pulvret. Håll kvar sprutan.



## 2. Blanda glukagonet


- Håll kvar sprutan i flaskan och **skaka försiktigt** tills pulvret löst sig helt.



## 3. Dra upp dosen


- Vänd flaskan upp och ner och dra upp **hela lösningen i sprutan**.

- Kontrollera att det **inte finns luftbubblor** i sprutan. Små bubblor är ingen större fara men det skall inte vara stora bubblor i sprutan.



## 4. Injicera glukagonet

- Stick in nålen i **låret**.
- Tryck in sprutans kolv helt för att ge hela dosen.
- Ring 112 om Charlie inte vaknar inom **5-10 minuter**.



## Viktigt att komma ihåg:

- **Ge aldrig något i munnen** till någon som är medvetslös.
- **Glukagon tar några minuter att verka**, håll koll på Charlie och ge snabb energi (saft, Dextrosol) när han vaknar.
- **Kontakta alltid sjukvården efter att ha gett glukagon.**

För mer detaljer om vad du ska göra vid medvetslöshet, se **Vad du ska göra om Charlie svimmar.**

---

Revision #11

Created 26 February 2025 22:51:13 by Lars

Updated 8 March 2025 02:27:22 by Lars